

## הכנה לקרת ביצוע קולונוסקופיה עם מרוקן (MEROKEN)

### הכנה זו מתאימה לחולים הסובלים מאי ספיקת כליות או אי ספיקת לב

#### 1. כלכלה ונכונה

מותר לאוכל	אסור לאוכל	זמן לבני
לחם לבן, פיתה, גatte, קרקרים מקמחן לבן, פשוטו, אטריות- מקמחן לבן, תפוח-אדמה, אורז לבן, דיסוט מוסולת ווקונגלו סוכו קציצות עוף, חזון, דג, כל ופיע מוציא חלב-ללא חתיכות ופיע מיצים טבעיים מסוננים	פירות, ירקות, דיתיות, אבוקדו dagums עם סיבים, לחם חישוח (לחם מלא) כוסמת, שיבולת שועל, בוגול, גרגולה וויבחיטה, תירס, קטניות, אפונה, שעוני, עדשים, חומום, פיצוחים-גרעינים, שקדים, בוטנים, שומשים	27 שעות לפני הבדיקה (3 ימים לפני הבדיקה)
כלכלה נזולית בלבד: מרקים צלולים, תה, נס קופה, ללא הלב, מיצי פרות מסוננים, דבש, ריבה צלולה, ג'לי (לא בצבע אדום), מים, משקאות מוגדים.	אוכל מוצץ מוציא חלב	24 שעות לפני הבדיקה (יום לפני הבדיקה)

#### 2. יום לפני הבדיקה:

\* יש להמנע ממאכל חלב למיניהם!

\* יש להקפיד על כלכלה נזולית הכלולת:

מרקים צלולים, דיסוט סולת על בסיס מים, תה, מיצי פירות  
מסוננים, ביצה רכה, דבש, ג'לי ופודינג על בסיס מים.

יום לפני הבדיקה בשעה 16:00 - יש לשותות כדור פרמיין. בשעה 17:00 אח"צ יש להשתול לשעת 3 ליטר של תמייסת מרוקן (MEROKEN NEW) במסך 3 שעות. *רצוי לשותות בקצב של כוס 200 מ"ל כל 15 דקות. *שתייה מהירה של כוס עדיפה על שתייה של כמהות קטנות לאורך זמן. *עדיף לבנק את התמייסה כדי להקל על השתייה. *תוך שעה וחצי מתחילה השתייה תרחשishi' צריך לששלל. *עליך להמשך לשותות את כל המכמות. *בנסיבות של פטסיק לאוכל. *ניתן לשותות מים עד 3 שעות לפני הבדיקה. *אחרה: אין להפסיק לתמייסת המרוקן תוספות כלשהן. *שעה אחריה שתיתת מרוקן יש לשותות 2 כדורי LAXSADINE 2.	מטופלים העוברים את הבדיקה בוקר ועד השעה 14:00
ביום הבדיקה בשעה 06:00 יש לשותות כדור פרמיין. בשעה 07:00 יש לשתול תרחותם הניתנות במהלך הבדיקה. *רצוי לשותות בקצב של כוס 200 מ"ל כל 15 דקות. *שתייה מהירה של כוס עדיפה על שתייה של כמהות קטנות לאורך זמן. *עדיף לבנק את התמייסה כדי להקל על השתייה. *תוך שעה וחצי מתחילה השתייה תרחשishi' צריך לששלל. *עליך להמשך לשותות את כל המכמות. *יש להפסיק לאכול 8 שעות לפני הבדיקה. *ניתן לשותות מים עד 3 שעות לפני הבדיקה. *אחרה: אין להפסיק לשותות מרוקן לשעות 2 כדורי LAXSADINE 2.	מטופלים העוברים את הבדיקה בשעות אח"צ אחרי השעה 14:00

#### לאחר הבדיקה:

\* לאחר הבדיקה מנוכה בחדר התואשות עד להתאוששות מלאה.  
\* שחרור, מידע על תוצאות הבדיקה, המשך טיפול ומעקב ייעשו ע"י הרופא המבצע.

אטופולת נכבדה שלום רב!

להלן מידע בדיקה שעלייר לעבר, באיחולי ההצלחה בבדיקה וביריאות

הין מודומת לבדיקה של דרכי העיכול התחתונות על ידי קולונוסקופיה

בתאריך \_\_\_\_\_ בשעה \_\_\_\_\_

אם מסיבה כלשהי איןך יכול להגיע לבדיקהanca הודיע/י על כך טלפון או בפקס לפחות 24 שעות לפני מועד הבדיקה.

#### מהי הבדיקה?

קולונוסקופיה היא בדיקה המאפשרת הסתכלות ישירה אל חלל המעי הגס  
באמצעי אבחנת-טיפול, הבדיקה מטבחת באמצעות אמצעות קולונוסקופ - צינור גזס  
ומגיש הבני מיסבים אופטיים, שסבירו מעטפת פלסטי ועובי אנטיב. הקולונוסקופ  
מוחדר דרך פה הטבעת.

לעתים מטבחות במהלך הבדיקה פעולות כמו ביופסיה או כריית פוליפים.

#### הנחיות ומידע חשוב לקרהת הבדיקה:

\* עליך לפקות למצוירות בית הרופא ביום ובשעה הרשומים בהזמנה.  
\* יש להביא התcheinיות סופית מעתיאה, תעודה מדזה, מכתב מפורט מהרופא  
שהפונה אותך לבדיקה או כל הפניה אחרת לבדיקה וכל מסמך רפואי ותוספות  
בדיקות הקשורות לבדיקה הקולונוסקופי.

\* יש להגיע עם מלווה. נהוגה או הפעלת מכשור עד 12 שעות לאחר הבדיקה הין  
פעולות מסווגות בשל השפעת תרחותם הניתנות במהלך הבדיקה.

\* מומלץ להגיע ללא חפצי ערך (כסף, תכשיטים וכו') וללבוש בלבד נון.  
\* הכנה לבדיקה מטבחת על שימוש משלשל הגורים לפעולות מעיים  
בתידירות גבואה ועל דיאטה נזולית פירוט בהמשך.

\* להכנה זו חשיבות מרבית, לאחר ורק נקיון מוחלט של חלל המעי מיפור  
בדיקה מדיקת ומימינה. ההכנה מתחילה 3 ימים (24 שעות) לפני הבדיקה  
בימים אלה אסור לאכול פירות וירקות או מזונות המכילים סיבים או זרעים  
במכל סוג שהוא: חיז אבו של.

\* אם הין סובל/ת מסוכרת, נא צייני זאת בעת  
הזמן התוור לבדיקה, ובקשרי כי תוריך קבוע לשעה מוקדמת.

#### לפני ביצוע הבדיקה יש לדוחה לרופא:

אם הין אלרגיה/ת לתרופות.  
אם הנר נטול/ת תרחותם כמו ברזל, יש להפסיק שבוע לפני הבדיקה.  
אם הנר נטול/ת קפדיין או פלביקס או תרחות אחרות לדילול הדם, יש להתייעץ  
עם הרופא המתפל או קרדיוולג לගבי הפסקתן 7 ימים לפני הבדיקה. אין צור  
להפסיק אספירין.

#### הכנות לקרהת הבדיקה:

רק נקיון מוחלט של המעי מאפשר בדיקה מדיקת וسلامה.  
כדי לנוקות את המעי חשוב להקפיד על כלכלה נזולית ולקחת את התרומות  
המתאימות למפורט בהמשך:  
אם המעי אינו נקי חלוטן אין אפשרות לבצע את הבדיקה.