



## הוראות הכנה לקולונוסקופיה עם מובייפרוף בוקר

במסגרת הבדיקה יוחדר צינור גמיש לאורך כל המעי הגס מפני הטעבת ועד לחיבור למעי הדק. הבדיקה מאפשרת רחפה להבחון גידולים מעאיים, פוליפים, דלקות ומרקומות דם. בימין הבדיקה תילכונה במהלך הבדיקה דגימות ורכמה לבדיקה פתולוגית ותבצע כריתה של פוליפים.

הבדיקה מבוצעת תחת הרדמה חלקית במטרה למנוע הריגשת כאב. הנבדק שוכב על צידו השמאלי והאנדוסקופ מוחדר דרך פי הטעבת ומאת קדם לאורך המעי תוך החדרת אויר. ניפוי המעי מאפשר הסתכלות טובה על רירית המעי הגס. הבדיקה אורכת כ-15 דקות. סיבוכים אפשריים הם הינקבות המעי או דימום. סיבוכים אלו נדרים ביותר. יש צורך בהכנה טובה של המעי על מנת לאפשר לרופא הסתכלות טובה.

### מויביפרוף

תッシュיר בטעם לימון המכיל 4 שקיות אבקה משני סוגים, שתי שקיות גודלות מס' 1 ושתי שקיות קטנות מס' 2. ארבעת השקיות נדרשות לטיפול אחד.

**\*\*\* חל אישור לשימוש לסובלים מחסום אנדיזים APP66P!**

#### הוראות הכנה התמיסה:

יש לצרף את תוכן שתי השקיות, שקיית מס' 1 ושקיית מס' 2 לכלי מדידה ולהוציא מים על מנת להשלים נפח ליליטר התמיסה. יש לערבב היטב את האבקה במים עד הנספה מלאה של האבקות ו渴בלת גוזל צלול או מעט מעורפל, בדרך כלל לוקח כ-5-6 דקות להמיס את האבקה במים. יש לשותה את הליטר הראשון והראשון של התמיסה בתוך שעיה עד שעתיים.

(cosa מן התמיסה המכונה כל 15 - 10 דקות). מומלץ מאד ללוות את הטיפול במובייפרוף בשתיית ליטר נוסף של גוזל צלול כלשהו כדוגמת: מים, מיץ פרו ללא חלבני פרי, מרק צח, קפה או תה ללא חלב וכן משקאות קלים, זאת על מנת למנוע מצב של צמא והתיישבות. ניתן לשותה משקאות אלה בכל זמן אשר נוח לך. יש להפסיק ליטול גוזלים כולל מובייפרוף, לפחות שעה אחת לפני ביצוע בדיקת הקולונוסקופיה.

#### אחסנה:

את השקיות הסגורות יש לשמור בטמפרטורה הנמוכה מ-25 מעלות צלזיוס.

#### הוראות ההכנה:

1. אם הינך נוטל ת כומדיין, אספירין (קרטיה), או טיקלידיל, פליוקם, או תכשירי ברזל, **יש להפסיק לטילת התרופה, יש להיעזע עם הרופא המתפל לגביה הפסיקם שבוע לפני הבדיקה ולחייב תשבורת INR מעודכנת.**

2. במשך 4 ימים לפני הבדיקה יש לשמר על דיאטה. לא לאכול פירות, ירקות (טריים/מבשילים) ומוניות המכילים סיבים כמו: גראנוללה, סובין, אורז, קורנפלקם, לחם שחור, נתין לאכול מוצרי חלב, עז, דגם, לחם לבן ופסטה.

3. יום לפני הבדיקה ובוים הבדיקה שתיתת גוזלים בלבד (מים, תה, יוגורט, מרק צח ומייצים).

4. יש להגיע לבדיקה יחד עם מלאו -

#### הנגשה אסורה כ-12 שעות לאחר הבדיקה.

#### מינון מקובל

המנה המומלצת הינה 2 ליטרים מן התמיסה המכונה.

#### נטילת מובייפרוף:




שני ליטרים מן התמיסה המכונה של מובייפרוף בערב לפני ביצוע הבדיקה, כשאת הליטר הראשון יש ליטול בשעה 16:00 ואת הליטר השני ב- 20:00.

#### הכנה באמצעות תרופה:

- יש להציג במרשם רופא ל- "מובייפרוף (MOVIPREP) + 4 טבליות NAXADIN .LAXADIN".
- יש ליטול 2 כדורי NAXADIN, רביע שעה לפני כל מנת מובייפרוף.

#### חשוב מכך:

- לאחר שתיתת ה"מובייפרוף" תרגיש צורך לשלשל, لكن רצוי להיות קרובים לשירותים.
- רצוי לאחסן את ה"מובייפרוף" במקerro לשיפור הטעם ניתן להמתיק את התמיסה המכונה.
- להמשיך לשותה עד ליטר גוזלים (חצי ליטר אחרי המנה הראשונה וחצי ליטר המנה השנייה) של גוזל צלול כלשהו.
- בכל זמן אשר נוח לך, על מנת למנוע מצב של צמא והתיישבות, גוזלים אלו ניתן לשותה ללא הגבלה ולהמתיק לפני הצורך.
- שעתיים לפני הבדיקה יש להפסיק בכלל כל שתיה ולהשאר בזום מלא.
- חובה להגיע לבדיקה עם מלאו בוגר.



#### הוראות הכנה התמיסה:

מרכז רפואי "בית הרופא" שדרות רגר 22 קומה ב'  
באר-שבע טל': 08-6652333, 1-700-501-333 פקס: 08-6652444



## הוראות הכנה ל��ולונוסקופיה עם מובייפרוף אחה"צ

במסגרת הבדיקה יוחדר צינור גמיש לאורך כל המעי הגס מפני הטבעת ועד לחיבור למעי הדק. הבדיקה מאפשרת לרופא להבחן גידולים ממאים, פוליפים, דלקות ומרקוזת דם. במידת הצורך תילקחנה במהלך הבדיקה דגימות ורकמה לבדיקה פתולוגיות ותבצע כרייתה של פוליפים.

הבדיקה מבוצעת תחת הרגדמת כאב. הנבדק שוכב על צידו השמאלי והאנדומוקופ מוחדר דרך פי הטבעת ומתן קדם לאורך המעי תוך החדרת אויר. ניפוי המעי מאפשר הסתכילות טובעה על רירית המעי הגס. הבדיקה אורכת 15-20 דקות. סיבוכים אפשריים הם הינקבות המעי או דימום. סיבוכים אלו נדרשים ביותר. יש צורך בהכנה טובעה של המעי על מנת לאפשר לרופא הסתכילות טובעה.

### mobiprep

תכשיר בטעם לימון המכיל 4 שקיות אבקה משני סוגים, שתי שקיות גדולות מספור 1 ושתי שקיות קטנות מספור 2. ארבעת השקיות נדרשות לשיטול אחד.

\*\*\* חל אישור לשימוש לסובלים מחסור אנדים CD66G! \*\*\*

### הוראות הכנה התמיסה:

יש לצרף את תוכן שתי השקיות, שקיית מס' 1 ו- 2 לכלי מדידה ולוחספ מים על מנת להשלים נפח לחיטור התמיסה. יש עלרבב היטב את האבקה במים עד המסה מלאה של האבקות ו渴בלת נוזל צלול או כמעט מעורפל, בדרך כלל לואק כ-5-6 דקות להמיס את האב-קה במים. יש לשתו את הליטר הראשון של התמיסה בתוך שעה עד שעתיים. כוסמן התמיסה המכונה כל 15 - 10 דקות. מומלץ מאד ללוות את הטיפול במובייפרוף בשתייה ליטר נוספת נוזל צלול כלשהו כדוגמת: מים, מיץ פרי ללא חלב פרי, מרק צה, קפה או תה ללא חלב וכן משקאות קלים, זאת על מנת למנוע מצב של צמא והתייבשות. ניתן לשותות משקאות אלה בכל זמן אשר נוח לך. יש להפסיק ליטול נוזלים כולל מובייפרוף, לפחות שעה אחת לפני הביצוע בדיקת הקולונוסקופיה.

### אחסנה:

את השקיות הסגורות יש לשמור בטמפרטורה הנמוכה מ-25 מעלות צלזיוס.

### הוראות ההכנה:

1. אם היין נוטלת קומדיין, אספירין (קרטיה), או שיקלידיל, פוליפום, או תכシリ ברצל, יש להפסיק נטילת התהופה, **יש להיעזר עם הרופא המתפל לגבי הפסיקת שבוע לפני הבדיקה ולהביא תשובת RN מעודכנת.**

2. במשך 4 ימים לפני הבדיקה יש לשמר על דיאטה. **לא לאכול** פירות, ירקות (טריריים/מבושלים) ועડונות המכילים סיבים כמו: גרגולה, סובין, אורז, קורנפלקסק, לחם שחור, נתן לאכול מוצרי חלב, עזיף, דגים, לחם לבן וופסדים.

3. יום לפני הבדיקה ובוים הבדיקה שתאית נוזלים בלבד.

(מים, תה, יוגרט, מרק צה ומיצים).

4. יש להגיע לבדיקה יחד עם מלאה -

### הגניה אסורה כ-12 שעות לאחר הבדיקה.

### מינון מקובל

המנה המומלצת הינה 2 ליטרים מן התמיסה המכונה.

### נטילת מובייפרוף:

ליטר מן התמיסה המכונה של מובייפרוף ערבע לפני ביצוע הבדיקה ב-00:00, ליטר נוספת של התמיסה המכונה של מובייפרוף בבוקר ב-00:10 ביום ביצוע הבדיקה.

### הכנה באמצעות תרופות:

■ יש להציג במרשם רפואי ל- "מובייפרוף" (MOVIPREP) + 4 טבליות NAXADIN.

■ יש ליטול 2 כדורי NAXIDIN, רביע שעה לפני כל מנת מובייפרוף.

### חשוב מכך:

■ לאחר שתאיית ה"מובייפרוף" תרגיש צורך לששלל, لكن רצוי להיות קרובים לשירותים.



■ רצוי לאחסן את ה"מובייפרוף" במקיר לסייע הטעם ניתן להמתיק את התמיסה המכונה.

■ להמשיך לשותות עד ליטר נוזלים (חצי ליטר אחרי המנה הראשונה וחצי ליטר אחרי המנה השנייה) של נוזל צלול כלשהו.

■ בכל זמן אשר נוח לך, על מנת למנוע מצב של צמא והתייבשות, נוזלים אלו ניתן לשותות ללא הגבלה ולהמתיק לפי הצורך.

■ שעתיים לפני הבדיקה יש להפסיק בכלל כל שתייה ולהשתאר בזמן מלא.

■ חובה להגיע לבדיקה עם מלאה בוגר.



### הוראות הכנה התמיסה: